



Заклад охорони здоров'я «Спеціалізований медико-діагностичний центр АЦМД»
м. Київ, Петропавлівська Борщагівка, вул. Петровавлівська 14-д

acmd-clinic.com
044 393 09 33

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ препаратом «Мовипрет»

Способ применения

Мовипреп® предназначен для приготовления раствора, принимаемого перорально (через рот). Взрослым пациентам и пациентам пожилого возраста в течение курса следует принять 2 литра разведенного препарата.

При приеме раствора Мовипреп® рекомендуется употреблять дополнительно не менее 1 литра прозрачной жидкости (воды).

Для приготовления первого литра препарата Мовипреп® содержимое 1 саше А и 1 саше В растворяют в небольшом количестве воды и перемешивая доводят объем до 1 литра. (Раствор должен быть прозрачный.) После употребления 1л. раствора, дополнительно нужно выпить 0.5 воды.

Приготовленный таким образом препарат следует выпить в течение 1-2 часов.

Второй литр препарата Мовипреп® разводят и принимают аналогично.

Прием препарата можно разделить на 2 варианта приёма:

1-й вариант (Колоноскопия без наркоза).

Двухэтапная подготовка:

- первый литр Мовипрепа принимают вечером в день перед проведением медицинской процедуры (с 19:00 до 21:00)

- второй литр препарата принимают утром (07:00 до 09:00) в день проведения процедуры.

Прием препарата прекратить за 3-4 часа до колоноскопии.

Важно! Во время курса лечения (подготовки) и до окончания клинической процедуры противопоказано употреблять твердую пищу.

2-й вариант (Колоноскопия под наркозом)

Одноэтапная подготовка

Вечером с (18:00 до 22:00) накануне проведения медицинской процедуры выпивают два литра препарата Мовипреп®.+ 1 литр воды.

Для прохождения колоноскопии с анестезиологическим обеспечением (под наркозом) необходимо:

1. Последний прием пищи должен быть не позднее 15:00 накануне исследования.

2. Последний приём жидкости (в том числе воды) не позднее 23:00 накануне исследования.

3. В день исследования прием пищи и жидкости (и даже воды) категорически запрещён!

В день обследования необходимо быть в клинике за 1 час до обследования натощак (не пить и не кушать). Перед исследованием Вас консультирует врач-анестезиолог. На основании медицинской информации о состоянии здоровья пациента, определит оптимальный вид

анестезии, который позволит пройти исследование комфортно и безопасно. На консультацию необходимо иметь результаты общего анализа крови (развернутый), глюкоза крови и ЭКГ.

Общие противопоказания к колоноскопии:

1. Инфаркт миокарда и 1 год после него
2. Инсульт и 1 год после него.
3. Психические заболевания в фазе обострения или нестойкой ремиссии
4. Дыхательная недостаточность в стадии декомпенсации.
5. Сердечная недостаточность

Каждому пациенту, которому назначена колоноскопия, важно помнить: для проведения этой процедуры под наркозом или каким-то другим видом обезболивания должны быть определённые показания, а не просто Ваше желание. Поэтому этот вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае врачом-эндоскопистом и анестезиологом.